

## HODOWCO DROBIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, w związku z utrzymującym się **zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków u drobiu**, wykryciem choroby w Niemczech na fermie niosek i **we Francji w chowie przyzagrodowym**, celem przeciwdziałania **możliwości przeniesienia wirusa choroby za pośrednictwem osób, pojazdów, sprzętu i dzikich ptaków**, **zaleca ściśle przestrzeganie zasad bioasekuracji stad i gospodarstw, w szczególności:**

- oznakowanie wjazdów i wejść do pomieszczeń z ptakami tablicą: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
- posiadanie środków odkażających w ilości niezbędnej do bieżącego odkażania,
- stosowanie odzieży i obuwia przeznaczonych wyłącznie do użycia w pomieszczeniach z ptakami,
- wyłożenie na stałe mat odkażających, nasączonych środkiem odkażającym przed wejściem do każdego pomieszczenia z ptakami.
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej odkażania, dezynsekcji i deratyzacji,
- utrzymywanie pomieszczeń dla ptaków w czystości,
- przechowywanie paszy, karmienie i pojenie ptaków w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków i innych zwierząt ( w pomieszczeniu ),
- zabezpieczenie pomieszczeń dla ptaków i innych obiektów przed dostępem dzikich ptaków i innych zwierząt,
- kontrola ściółki przeznaczonej do pomieszczeń dla ptaków w zakresie zanieczyszczenia odchodami dzikich ptaków,
- szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych, dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia,
- hodowcy mogą przenieść wirusa przy braku przestrzegania zasad bioasekuracji,
- konieczne staje się sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren gospodarstwa oraz ocena wizualna skuteczności zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów,
- w przypadku zaobserwowania u ptaków niepokojących zmian (apatii, zwiększonej śmiertelności, spadku przyrostów wagi, spadku spożycia paszy i wody), mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, i zawiadomić o takim podejrzeniu Inspekcję Weterynaryjną lub lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Brzegu  
lek. wet. Barbara Maj-Świerczyńska



